

Derleme / Review

## FORAMİNAL TÜMÖRLERDE EKSTRAFORAMİNAL ÇIKARIM

### EXTRAFORAMINAL APPROACH FOR REMOVING OF THE FORAMINAL TUMORS



Konu ile ilgili bağlantıya yandaki linkten ulaşabilirsiniz <https://www.spinetr.com/video.aspx?video=15>

Foraminal tümörlere yaklaşım eskiden olduğu gibi orta hat girişimi ve transfaset yaklaşım ile yapılabildiği gibi, posterolateralden transforaminal yaklaşım ile de yapılabilir. Bu yöntemde kas hasarı minimaldir. Faset hasarı da çok azdır. Buna göre, operasyon seviyesi skopide belirlendikten sonra orta hattın 4 cm lateralinden bir vertikal kesi yapılır. Çift fasya katı geçilir, kaslar ayrıştırılır ve ekartör yerleştirilir. Her iki transvers ortaya konur. Tümör uzanımına göre bir

miktar kranial veya kaudale uzatılabilir. İntertransvers kas ve bantlar alınca tümör görülür. Tümör olabildiğince ortaya konur. Nörofibromlarda kök genelde tümör kılıfındadır. Tümör kılıfı açılır. Tümörün içi mikroskop altında boşaltılır. Kök aranır. Kök korumaya alındıktan sonra tümör kılıfı da alınır. Metastatik tümörlerde ise öncelikle kök bulunmalıdır. Kök üst pedikül ve üst transvers altındadır. Kök bulununca tümör çıkarılır.